



Naturraum Nationalpark Hohe Tauern (Gesamt, Kärnten, Salzburg, Tirol)

Die Angaben für Kärnten, Salzburg, Tirol sind den entsprechenden Standarddatenbögen entnommen

Lebensraumtypen (gemäß Anhang I der FFH-RL)

| Name | Priorität | Vorkommen | | | Repräsentativität | | |
|--|-----------|-----------|-----|---|-------------------|---|---|
| | | K | S | T | K | S | T |
| Dystrophe Seen und Teiche | * | | x | | | B | |
| Alpine Flüsse mit krautiger Ufervegetation | | x | | x | A | | A |
| Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Myricaria germanica</i> | | | | x | | | C |
| Alpine Flüsse mit Ufergehölzen von <i>Salix eleagnos</i> | | x | | | A | | |
| Alpine und boreale Heiden | | x | x | | A | A | |
| Buschvegetation mit <i>Pinus mugo</i> und <i>Rhododendron hirsutum</i> | * | | (x) | | | D | |
| Boreo-alpines Grasland auf Silikatsubstraten | | x | | x | A | | B |
| Alpine und subalpine Kalkrasen | | x | x | | A | B | |
| Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden | * | x | x | x | B | B | A |
| Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe | | x | x | | B | A | |
| Berg-Mähwiesen | | x | | x | B | | A |
| Lebende Hochmoore | * | | x | x | | A | C |
| Übergangs- und Schwinggrasemoore | | | x | | | A | |
| Kalkreiche Niedermoore | | x | | | B | | |
| Alpine Pionierformationen des <i>Caricion bicoloris-atrofuscae</i> | * | x | x | x | B | A | A |
| Silikatschutthalden der montanen bis nivalen Stufe (<i>Androsacetalia alpinae</i> und <i>Galeopsietalia ladani</i>) | | x | x | x | A | A | A |
| Kalk- und Kalkschieferschutthalden der montanen bis alpinen Stufe (<i>Thlaspietea rotundifolii</i>) | | x | x | | B | A | |
| Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas | | | | x | | | B |
| Kalkfelsen mit Felsspaltvegetation | | x | | | B | | |
| Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation | | x | | | A | | |
| Silikatfelsen mit Pioniervegetation des <i>Sedo-Scleranthion</i> oder des <i>Sedo albi-Veronicion dillenii</i> | | | (x) | x | | D | D |
| Nicht touristisch erschlossene Höhlen | | | x | | | A | |
| Permanente Gletscher | | x | x | | A | A | |
| Hainsimsen-Buchenwald (<i>Luzulo-Fagetum</i>) | | | (x) | | | D | |
| Waldmeister-Buchenwald (<i>Asperulo-Fagetum</i>) | | | x | | | B | |
| Schlucht- und Hangmischwälder <i>Tilio-Acerion</i> | * | x | x | | B | B | |
| Moorwälder | * | | x | x | | B | B |
| Auenwälder mit <i>Alnus glutinosa</i> und <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>) | * | | x | x | | A | A |
| Montane bis alpine bodensaure Fichtenwälder (<i>Vaccinio-Piceetea</i>) | | x | x | | B | A | |
| Alpiner Lärchen- und/oder Arvenwald | | | x | x | B | A | A |

Die Liste enthält nur die in der FFH-RL angeführten Lebensräume. Zahlreiche weitere Biotoptypen bleiben in dieser Aufzählung unberücksichtigt. Schutzgüter, die aufgrund ihrer Repräsentativität als nicht signifikant gemeldet wurden, sind in Klammern gesetzt.